


Аутолитическая санация раневой полости с применением геля для обработки ран Октенилин

Омертвевшие ткани и фибриновое покрытие легко растворяются за короткий промежуток времени.

95-летний пациент женского пола страдает ПАОБ (периферическая артериальная окклюзионная болезнь) и сахарным диабетом. Пролежневая язва выступила на правой пятке. В связи с тем, что общее состояние язвы тяжелое, а также по просьбе самого пациента, первичная обработка раны, несмотря на наличие некротического покрытия, производилась гелем для обработки ран Октенилин. Пациент в свою очередь отреагировал хорошо на проведение данного типа лечения. Теперь омертвевшие ткани и фибриновое покрытие раны можно растворить и легко устранить за короткий промежуток времени. Аутолитическая санация раны с применением геля для обработки ран Октенилин завершена. Хирургическое вмешательство не требуется.



День 1

Обширная область омертвевших тканей с близлежащим фибриновым покрытием на правой пятке пациента в начале проведения местного лечения.



День 10

На 10-й день лечения, заметное уменьшение признаков раздражения в близлежащей области благодаря сопутствующему уходу за кожей. Начало увлажнения омертвевшей ткани посредством обработки геля Октенилин.



День 10

Омертвевшие ткани хорошо растворяются благодаря обработке с применением геля Октенилин. Фибриновое покрытие устраняется без каких-либо механических воздействий.



Спустя 4 недели

После 4-х недельного лечения с применением геля для обработки ран Октенилин, полное отслоение омертвевшей ткани и фибринового покрытия, в процессе чего формируется обновленная грануляционная ткань. Отчетливое уменьшение раны в размерах.